

Haut

Diese Broschüre informiert über die Symptome der Haut beim Birt-Hogg-Dubé-Syndrom.

Birt-Hogg-Dubé Syndrom

Das Birt-Hogg-Dubé-Syndrom (BHD) ist eine seltene Erkrankung, verursacht durch Veränderungen im Folliculin-Gen. Menschen mit BHD können Folgendes aufweisen:

1. Hautknötchen (Fibrofollikulome)
2. Lungenzysten
3. Lungenkollaps (Pneumothorax)
4. Nierenkrebs (Nierenzellkarzinom)

BHD äußert sich bei jedem Betroffenen unterschiedlich. Sollten Sie an BHD leiden, können sowohl ein paar, sämtliche oder keines dieser Symptome auftreten.

Fibrofollikulome

- Die Mehrheit der BHD Betroffenen weisen kleine, blasse Hautknötchen auf Gesicht, am Hals, auf den Ohren und auf dem Oberkörper auf.
- Diese Hautknötchen werden Fibrofollikulome genannt.
- BHD-Betroffene können sowohl ein paar als auch Hunderte dieser Hautknötchen entwickeln.
- Die Hautknötchen entstehen für gewöhnlich nach dem 20. Lebensjahr und verschlimmern sich im Laufe der Zeit.
- Bei den Knötchen handelt es sich um gutartige Tumore des Haarfollikels.
- Sie sind weder krebsartig noch schädlich für Ihre Gesundheit, bei einigen Menschen wirken sie sich jedoch nachteilig auf das Selbstbewusstsein aus.
- Es gibt eine Vielzahl an Hauterkrankungen, die denen des BHD ähneln, es jedoch nicht sind. Es ist notwendig, einen Dermatologen aufzusuchen, der Ihnen sagen kann, um welche Art von Hautveränderung es sich bei Ihnen handelt. Ihr Arzt sollte dies für Sie arrangieren können.



Fibrofollikulome. Fotos freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Dr. Derek Lim, University of Birminham, GB

Behandlung

- Es gibt mehrere Behandlungsmöglichkeiten für Fibrofollikulome (Auflistung auf der nächsten Seite).
- All diese Behandlungen sind temporär und können die Entstehung neuer Fibrofollikulome nicht aufhalten. Sie verursachen möglicherweise Narbenbildung oder haben sonstige Nebenwirkungen. **Sie sollten mit Ihrem Arzt darüber sprechen.**
- Bei der Wahl einer Behandlung sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Arzt von Ihrer BHD-Erkrankung weiß.
- Vielleicht ist es zudem ratsam, einen Therapeuten aufzusuchen, falls Ihr Selbstbewusstsein unter dem Zustand Ihrer Haut leidet.

Behandlung

1. Laserbehandlung - Einsatz eines Lasers zur Entfernung von Fibrofollikulomen.
2. Chirurgische Entfernung - Abschneiden der Fibrofollikulome.
3. Kauterisation - Einsatz sehr hoher oder niedriger Temperaturen zur Entfernung von Fibrofollikulomen.
4. Radiofrequenz-Ablation - Einsatz von Radiowellen zur Entfernung von Fibrofollikulomen.
5. Hyfrecation - Einsatz von Elektrizität zur Entfernung von Fibrofollikulomen.

Welche Behandlungsmöglichkeiten für Sie verfügbar sind hängt von dem Land, in dem sich Ihr Wohnsitz befindet, sowie Ihrer Krankenversicherung ab.

Datum der Veröffentlichung: May 2015
Datum der Revision: May 2017

Produziert von der BHD Foundation
Website: www.BHDSyndrome.org
Email: contact@BHDSyndrome.org



Sämtliche Quellen, die zur Bereitstellung dieser Informationen genutzt wurden, sind online zu finden unter: http://www.bhdsyndrome.org/wp-content/uploads/2013/11/BHD-information-pamphlets-references_v2.pdf