

Lunge

Diese Broschüre informiert über die Symptome der Lunge beim Birt-Hogg-Dubé-Syndrom.

Birt-Hogg-Dubé Syndrom

Das Birt-Hogg-Dubé-Syndrom (BHD) ist eine seltene Erkrankung, verursacht durch Veränderungen im Folliculin-Gen. Menschen mit BHD können Folgendes aufweisen:

1. Hautknötchen (Fibrofollikulome)
2. Lungenzysten
3. Lungenkollaps (Pneumothorax)
4. Nierenkrebs (Nierenzellkarzinom)

BHD äußert sich bei jedem Betroffenen unterschiedlich. Sollten Sie an BHD leiden, können sowohl ein paar, sämtliche oder keines dieser Symptome auftreten.

Lungenzysten

- Die Mehrheit aller BHD-Betroffenen entwickeln Lungenzysten.
- Diese werden außerdem Lungenbläschen oder Bullae genannt.
- Lungenzysten sind luftgefüllte Beutel an der Außenfläche der Lunge.
- Lungenzysten erschweren das Atmen nicht.
- Lungenzysten werden durch Röntgen- oder CT-Aufnahmen nachgewiesen .

Lungenkollaps

- Etwa 1 von 4 BHD-Betroffenen wird mindestens einmal einen Lungenkollaps erleben.
- Dieser ist als Spontanpneumothorax bekannt.
- Ein kleiner Pneumothorax kann in einigen Fällen von selbst heilen. Ein größerer oder vollständiger Pneumothorax erfordert eine medizinische Versorgung.
- Um festzustellen, ob bei Ihnen ein Pneumothorax vorliegt ist eine Röntgenaufnahme oder ein CT-Scan erforderlich.

Die Symptome eines Lungenkollaps sind:

1. Ein scharfer, stechender Schmerz in einer Seite der Brust
2. Eine Verschlimmerung des Schmerzes durch das Atmen
3. Schwierigkeiten beim Atmen
4. Trockener Husten

Sollte eines dieser Symptome auf Sie zutreffen, **begeben Sie sich so schnell wie möglich in ein Krankenhaus.**

Behandlung

- Es gibt mehrere Behandlungsmöglichkeiten für eine kollabierte Lunge (Auflistung auf der nächsten Seite).
- Jeder Fall ist anders. Das heißt, dass Sie im Falle eines erneuten Lungenkollapses möglicherweise beim nächsten Mal eine andere Behandlung erhalten.

Sie sollten mit Ihrem Arzt die für Sie passendste Behandlungsmethode erörtern.

Behandlung

1. Thorakostomie der Brust - Es wird ein Drainageschlauch in den Brustraum eingeführt. Die Luft wird abgesaugt und die kollabierte Lunge kann sich anschließend selbst wieder ausdehnen.
2. Pleurodese - Ein Eingriff, bei dem die Lungen an der Brustwand angebracht werden, wodurch ein erneuter Kollaps verhindert wird.

Welche Behandlungsmöglichkeiten für Sie verfügbar sind hängt von dem Land, in dem sich Ihr Wohnsitz befindet, sowie Ihrer Krankenversicherung ab.

Vorsichtsmaßnahmen

BHD-Betroffene sollten mit Ihrem Arzt sprechen bevor Sie sich in drucklose Flugzeuge begeben, Sporttauchen oder bestimmte andere Sportarten ausüben.

Datum der Veröffentlichung: May 2015
Datum der Revision: May 2017

Produziert von der BHD Foundation
Website: www.BHDSyndrome.org
Email: contact@BHDSyndrome.org



Sämtliche Quellen, die zur Bereitstellung dieser Informationen genutzt wurden, sind online zu finden unter: http://www.bhdsyndrome.org/wp-content/uploads/2013/11/BHD-information-pamphlets-references_v2.pdf